

平成29年5月24日
JA大潟村営農支援課
大潟村メロン生産班

ハダニの防除について

今後気温が上昇してくると、昨年同様にハダニによる被害が予想されます。ハダニに関してはある程度の期間での定期的な防除が被害を防ぐこととなりますので、下記の薬剤等を参考にしながら、防除にあってください。

(散布に関する注意事項)

- ★ 葉の裏までまんべんなく散布する。
- ★ 一部で見られれば、すでにハウス全体に広がっていると考えられるので、部分的な防除ではなく、ハウス全体を防除する。

～開花前～

ハダニの発生は比較的少ない時期なので、他の病害虫にも効果のある予防的な薬剤で防除をする。特にミツバチを導入する前なので、ミツバチに影響が大きい薬剤(メロン栽培技術情報NO,2参考)は使用しないでください。

(1回目)

適用病害名	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
アブラムシ・ダニ予防・発生	アーデント水和剤	1,000倍	前日まで	5回

～交配後～

着果確認後、再度防除する。以後10日程度の間隔で、防除を行う。

(2回目)

適用病害名	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
ハダニ類予防・発生	コロマイト乳剤	1,000倍	前日まで	2回

(3回目)

適用病害名	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
ハダニ類予防・発生	ダニサラバフロアブル	1,000倍	前日まで	2回

～発生後～

(4回目)

適用病害名	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
ハダニ類発生時	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日まで	1回