


田植時の除草体系

育苗前半は生育がやや遅れ気味でしたが、5月に入り好天日が続いたことで、苗の生育は平年並みとなっております。


今後の天候によっては雑草の発生が懸念されますので、早めの除草剤散布を心がけ雑草対策をしてください。

【田植時の除草体系】

1) [ホタルイ]の除草剤体系



2) [オモダカ]の除草剤体系



3) [コナギ]の除草剤体系




4) [クログワイ]の除草剤体系



5) [マツバイ]の除草剤体系



※表層剥離等で除草剤の拡散抑制による効果低下が懸念される場合



区分	薬剤名	成分名及び含有量 (%)			成分数
初期剤	メテオフロアブル	ペントキサゾン 5.0			1
	サインヨシフロアブル	ペントキサゾン 8.6			
	ユニハーブフロアブル	プレチラクロール 5.0	ベンゾフェナップ 20.0		2
	クリアハーブフロアブル	ペントキサゾン 4.0	ACN 18.0		
	テマカットフロアブル	ペントキサゾン 7.2	ダイムロン 28.0		
	ショキニーフロアブル	ペントキサゾン 4.0	プロモブチド 18.0		
初・中期一発剤	ビクトリ-Z・メガゼータフロアブル	ピラクロニル 3.9	プロピリスルフロン 1.7		2
	キクンジャー-Zフロアブル	ピラゾレト 27.3	プロピリスルフロン 1.6		
	ガンガン豆つぶ 250	フェキサスルホン 8.0	ピリミスルファン 2.0		
	ウィナーフロアブル	イプフェンカルハゾン 5.0	プロモブチド 18.0	ベンズスルフロンメチル 1.4	3
	月光フロアブル	メタズスルフロン 2.0	カフェンストロール 5.4	ダイムロン 30.0	
	銀河フロアブル	メタズスルフロン 2.0	ピラクロニル 4.0	ダイムロン 20.0	
	バッチリフロアブル	ピラクロニル 3.7	イマズスルフロン 1.7	プロモブチド 16.3	
	イネキングフロアブル	ピラクロニル 3.6	ピラゾレト 20.0	ベンゾビシクロン 4.0	
	イッポンフロアブル	ピラクロニル 4.0	ベンズスルフロンメチル 1.4	プロモブチド 18.0	
中期剤	アトトリ1キロ粒剤	ピリミスルファン 0.75			1
	フォロアップ1キロ粒剤	ペノキススラム 0.6	ダイムロン 10.0		2
	ワイドショット1キロ粒剤	ペノキススラム 0.5	テフリルトリオン 3.0		
	オシオキMX1キロ粒剤	アジムスルフロン 0.18	ピリフタリド 1.8	メソトリオン 1.0	3
	レブラス1キロ粒剤	メタズスルフロン 1.2	ジメタメリン 1.0	テフリルトリオン 3.0 ダイムロン 10.0	4

※ 育苗中にばか苗の発生が見られた場合は、圃場に持ち込まないようハウス内で抜き取りをお願いします。

※ ハウス周辺等に除草剤を散布する際は、近隣ハウスへの飛散に十分注意してください。