

雑草・病虫害防除は早めに

本年は田植え中の好天日が多く、全般的に苗の活着は良好となっております。早期に田植えが終了した圃場では、雑草の発生も見られておりますので、早めの除草剤散布を心がけてください。

また、初中期一発剤の使用後に雑草の残った場合は、以下の薬剤で対応してください。

1. 中・後期除草剤の雑草防除

薬剤名		成分数	使用時期	ヒエ葉令	適用雑草
ヒエ剤	クリンチャー-1キロ粒剤	1	田植後7日～ 収穫30日前	4.0葉	ノビエ
	クリンチャー-EW乳剤		田植後20日～ 収穫30日前	6.0葉	ノビエ 展着剤加用 10a当り 100ml/水25～100ℓ
ヒエ・広葉剤	アクシスMX1キロ粒剤	3	田植後7日～ 収穫45日前	4.0葉	コナギ、ホタルイ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、マツバイ
	オシオキMX1キロ粒剤	3	田植後14日～ 収穫45日前	4.0葉	ホタルイ、クログワイ、セリ、コウキヤガラ、シズイ
	レプラス1キロ粒剤	4	田植後14日～ 収穫60日前	4.0葉	オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ホタルイ、マツバイ
	ワイドショット1キロ粒剤	2	田植後15日～ 収穫45日前	4.0葉	ホタルイ、クログワイ、セリ、マツバイ、オモダカ
	クリンチャー-バスME液剤	2	田植後15日～ 収穫50日前	5.0葉	ノビエ、広葉雑草 10a当り 1,000ml/水70～100ℓ
	フォロアップ1キロ粒剤	2	田植後15日～ 収穫60日前	5.0葉	オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ホタルイ、マツバイ、セリ
	アトトリ1キロ粒剤	1	田植後20日～ 収穫45日前	4.0葉	ノビエ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ
広葉	ハサグラン液剤	1	田植後15日～ 収穫50日前	広葉雑草 落水又はごく浅水で使用 10a当り 500ml/水70～100ℓ	

2. 病虫害防除

現在、一部でイネミズゾウムシの発生が目立っております。畦畔沿いを主体に確認のうえ、発生が多い圃場ではつぎの薬剤で防除に努めてください。

薬剤名		成分	使用量/10a
トレボン	粒剤	1	2.0 kg
	粉剤DL		3.0 kg